

Protokoll för behandling med neuroleptika:

Pat. namn _____ Personnummer _____

Ansv. Teampersonal _____ ÖL _____

1. Nyinsättning / Behandling sedan tidigare

Läkemedel/dos: _____

Datum för insatt
behandling: _____ Mål: _____

2. Telefonsamtal efter 3 veckor(v.3) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

3. Telefonsamtal efter ytterligare 3 veckor (v.6) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

4. Telefonsamtal efter ytterligare 3 veckor (v.9) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

5. Telefonsamtal efter ytterligare 3 veckor (v.12) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

OBS! 3 månader sedan insättningen!!! Utsättning möjlig?

Pat. namn _____ Pers.nummer _____ - _____

6. Telefonsamtal efter 4 veckor (v.16) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

7. Telefonsamtal efter 4 veckor(v.20) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

8. Telefonsamtal efter 3 veckor(v.24) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

OBS!! 6 månader sedan insättningen!!! Utsättning möjlig??

9. Telefonsamtal efter 12 månader (1år) Datum: _____

Biverkningar: nej _____ ja _____

Effekt: ja _____ nej _____

=> medicinjustering: _____

Neuroleptika vid BPSD

Indikation:

- psykotiska symtom (vanföreställningar, hallucinationer) som signifikant påverkar patient/personal
- svår aggressivitet/agitation som påverkar patient/personal/medboende

⇒ icke farmakologiska åtgärd har inte visat tillräcklig effekt

Insättning:

- Startdos så låg som möjligt!
- Kan ges x1 eller x2 dagligen beroende på symtom!

⇒ **Definiera behandlingsmål i samband med insättningen!**

Underhållsbehandling:

- Små doshöjningar! Avvakta åtminstone 1 vecka!
- Försök alltid att hitta den lägsta möjliga dos!
- Beakta maxdosering: t.ex.
 - Risperidon max 1,5 mg dagligen
 - Haloperidol max 2,0 mg dagligen

⇒ **Observera och dokumentera effekter och bieffekter!**

Utsättning:

- Lägsta möjliga dos!
- Ju längre behandlingstid desto långsammare nedtrappning!

⇒ **Målet är att sätta ut behandlingen!!**

Biverkningar i samband med neuroleptikabehandling:

- förändring av rörelseförmåga
 - o stelhet
 - o gång med små steg
 - o framåtlutande kroppshållning
 - o skakningar
 - hypersalivering
 - felsväljning
 - trötthet, slöhet
 - avtrubbning
 - ökad fallbenägenhet
 - blodtrycksfall vid uppresning, yrsel
 - övriga symtom
-

- stroke – symtom
- död

Vanligaste Neuroleptika:

- **Risperidon** (Risperdal)
- **Haloperidol** (Haldol)
- **Quetiapin** (Seroquel)
- **Olanzapin** (Zyprexa)
- **Clozapin** (Leponex)